



ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଓ ନଳୀ ପୋକର ପରିଶୁଳନା ନିମନ୍ତେ ଶୁଣା ଭାଇ ଓ ଉତ୍ତରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିପ୍ ଧାନ ଫସଳରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଓ ନଳୀ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାବେଳାଛି ।

ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ନଳୀପୋକ ଆକୁମଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ପାଣି ସୁଅସରେ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଖାଲୁଆ ବିଲରେ ଜମା ହୋଇଯାଆଛି । ତେଣୁ ଖାଲ ଜମିରେ ଏହି କୀଟର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଶୁକରୁଦ୍ଧିକ ପତ୍ରରୁ ସବୁଜ କଣା କୋରି ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଧଳା ଦେଖାଯାଏ । ଶୁକ ପତ୍ରକୁ କାଟି ନଳୀ କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ରହେ । ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଧାନ ପତ୍ରକୁ କଇଁଚିରେ କାଟିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ପ୍ରଜାପତି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଧଳା ଓ ଦିନ ବେଳେ ଉଡ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ।

ଉଦ୍ଧୁ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ଅଧିକ ଆକୁମଣ ଲରିଥାଏ । ଏହି କୀଟର ପ୍ରଜାପତି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଓ ତେଣାରେ କଳା ଗାର ସବୁ ଥାଏ । ଶୁକରୁଦ୍ଧିକ ପତ୍ରଧାରକୁ ନିଜ ଲାଳ ଦାରା ଗୁଡ଼ାଇ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହି ସବୁଜ ଅଂଶ କୋରି ଖାଆନ୍ତି । ପତ୍ର ଉପରେ ସମାନରାଜ ଧଳା ଦାର ସବୁ ଦେଖାଯାଏ । ଥୋଡ଼ ପତ୍ର ବାହାରିବା ସମୟରେ ଏହି କୀଟର ଆକୁମଣ ହେଲେ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

ପରିଚାଳନା

- ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଓ ନଳୀପୋକ ଆକୁନ୍ତ ବିଲରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ବାଲି ସହ ଏକ ଲିଟର କିରୋସିନ୍ ଭଲଭାବରେ ମିଶାଇ ବିଷି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଧାନଗଛ ଉପରେ ଦୂର ପତ୍ର ଦୂର ଜଣା ଦରଢ଼ି ଧରି ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ଶୁକରୁଦ୍ଧିକ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ମରିଯିବେ ।
- ଅଧିକ ଆକୁନ୍ତ ବିଲରେ ନିମ୍ନୋଡ଼ କୀଟନାଶକରୁ ଯେକୋଣେବି ଗୋଟିଏ ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ନଳୀ ପୋକ		ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ	
କୀଟନାଶକ	ଏକର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା	କୀଟନାଶକ	ଏକର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା
ପିପ୍ରାନ୍ତିଲ ୪% ଏସ.ସି.	୪୦୦ ମି.ଲି.	କାର୍ତ୍ତପହାଇତ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪୦% ଏସ.ସି.	୪୦୦ ଗ୍ରାମ
ଇଷ୍ଟକ୍ଵାକାବ ୧୪.୪% ଏସ.ସି.	୨୦୦ ମି.ଲି.	ଇଷ୍ଟକ୍ଵାକାବ ୧୪.୪% ଏସ.ସି.	୨୦୦ ମି.ଲି.
ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ରେସ୍ ୪୦% ଇ.ସି.	୪୦୦ ମି.ଲି.	ଲାମତାସାଇହାଲୋଥ୍ରୀନ୍ ୨.୪% ଇ.ସି.	୨୦୦ ମି.ଲି.

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ନିମନ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା
ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା